

تعریف سقط:

دفع محصولات حاملگی قبل از هفته ۲۰ بارداری را سقط گویند. به دفع محصولات حاملگی بعد از هفته ۲۰ بارداری زایمان نام دارد.

شایع ترین عارضه بارداری ها سقط می باشد که در ۱۵ درصد حاملگی های تشخیص داده شده سقط رخ میدهد از آنجا که برخی بارداری ها بدون تشخیص منجر به سقط شده نمیتوان آمار دقیقی از کل بارداری ها بیان نمود.

نکته ۱: در صورتیکه در ساک حامکی جنین یا رویان نباشد یا جذب شده باشد به این بارداری تخم پوچ یا ساک خالی گویند.

نکته ۲: در صورت عدم رویت قلب جنینی در زمان مورد انتظار در سونوگرافی به آن "جنین بدون قلب" اتلاق میشود.

علل سقط: علل جنینی - علل والدی - علل خارجی

علل جنینی:

اکثر (۶۰٪) سقطهای سه ماهه اول با علل کروموزومی رخ میدهد. علل والدی:

سن مادر رابطه مستقیم با سقط دارد بطوریکه با افزایش سن مادر بعد از ۳۵ سالگی سقط افزایش میابد و در سن بالای ۴۵ سال بیش از ۵۰ درصد حاملگی ها سقط میشوند که علت آن پیر شدن تخمک و مشکلات ژنتیکی است. البته سن زیر ۲۰ سال هم میزان سقط را ۱۲ درصد ذکر شده است.

سابقه سقط در بارداری قبلی احتمال سقط بارداریهای بعدی را افزایش می دهد.

همچنین مشکلات رحمی مادر از جمله میوم رحمی - رحم دوشاخ - رحم تک شاخ - رحم دیواردار - نارسایی دهانه رحم - اختلالات هورمونی مادر - مشکلات تخمدانی و مشکلات ایمنی مادر از جمله علل مادری سقط جنین میباشد.

علل خارجی:

مصرف داروها - مواد شیمیایی - قهوه زیاد - الکل - سیگار

انواع سقط:

تهدید به سقط - سقط اجتناب ناپذیر - سقط ناقص - سقط کامل - سقط فراموش شده - سقط عفونی و سقط مکرر

تهدید به سقط: هر نوع ترشح خونی یا خونریزی رحمی در نیمه اول بارداری که ممکن است چند روز طول بکشد و معمولاً بعد از این علامت کرامپ شکمی و کمردرد نیز همراه است و بافت و نسج جنینی دفع نشده و در معاینه واژینال دهانه رحم بسته است.

تشخیص با سونوگرافی واژینال میباشد که در سونوگرافی جنین طبیعی و حیات دارد.

درمان: استراحت - عدم نزدیکی

پیش آگهی: در صورت کاهش درد و خونریزی ادامه بارداری اتفاق میافتد و در صورت افزایش درد و خونریزی و کاهش سطح بتا HCG احتمال سقط افزایش میابد.

سقط اجتناب ناپذیر: در صورت خونریزی واژینال همراه با درد و یا پارگی کیسه آب و باز شدن دهانه رحم سقط از نوع اجتناب ناپذیر میباشد.

تشخیص: معاینه واژینال و سونوگرافی

درمان: تخلیه محتویات رحم از طریق کورتاژ یا درمان دارویی

سقط ناقص: محتویات بارداری بصورت ناقص از دهانه رحم دفع شده و قسمتی از بقایای جفت یا نسج جنینی داخل رحم باقیمانده است.

تشخیص: سونوگرافی

درمان سقط ناقص: مشابه سقط اجتناب ناپذیر

از جمله کوچک شدن سایز سینه ها و عدم رشد سایز رحم

سقط کامل: دفع کامل محتویات رحم (جفت و جنین و ساک حاملگی) که بدنال دفع بسرعت خونریزی و درد کاهش میابد.

تشخیص: در معاینه واژینال دهانه رحم بسته و در سونوگرافی رحم خالی میباشد.

درمان خاصی نیاز ندارد و جهت اطمینان از خالی بودن رحم سونوگرافی کمک کننده است.

سقط فراموش شده: جنین مدت طولانی است که مرده است.



سقط عفونی: بدنال دستکاری رحم در شرایط غیر استریل مادر دچار تب و درد شکم و درد رحم همچنین ترشحات قهوه ای بدبو میشود. بسیار خطرناک است و برای مادر تهدید کننده حیات میباشد.

تشخیص: سونوگرافی به همراه ارزیابی آزمایشگاهی و چک علائم حیاتی

درمان: بستری و دریافت آنتی بیوتیک و کورتاژ

سقط مکرر: اگر خانمی ۳ یا بیشتر از ۳ بار متوالی در سه ماهه اول بارداری سقط داشته باشد سقط از نوع مکرر می باشد. برای ۵۰ درصد این نوع سقط علتی یافت نشده است.

تشخیص: بررسی آزمایشگاهی - ارزیابی ساختاری رحم (سونوگرافی و عکس رنگی)

آموزش و توصیه های لازم به مادران به دنبال سقط:

مادر باردار به هر علتی در بارداری دچار لکه بینی یا خونریزی شود باید از نظر گروه خون ارزیابی شود تا در صورت منفی بودن گروه خون مادر و مثبت بودن گروه خون همسر آمپول روگام تزریق شود زیرا تداخل خونی طی برداری موجب مشکلات خونی جنین در بارداری های بعدی مادر میشود این مورد (ارزیابی و تعیین گروه خون) برای سقط نیز باید بررسی شود.

علائم خطر بدنال سقط:

خونریزی بعد از سقط یا کورتاژ همانند پریود میباشد که در صورت دفع لخته - خونریزی بیش از پریود - ادامه خونریزی بیش از ده روز - ترشحات بد بو و عفونی - درد شکم و لگن - سرگیجه و تاری دید. در صورت بروز هر گونه علام خطر میبایست به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کند.



سقط

و خودمراقبتی در آن

کد محتوا: wd-pf

مشاور علمی: دکتر فریناز فرهبد

فوق تخصص پریناتالوژی

واحد آموزش سلامت همگانی و بیماران

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اصفهان

راه های ارتباطی با ما:

www.beheshti.mui.ac.ir


سایت بیمارستان جهت دسترسی به منابع کامل
آموزشی و اطلاعات به روز شده در خصوص خدمات ما

۰۳۱-۳۲۳۶۷۰۰۱ شماره بیمارستان و شماره گیری

داخلی ۲۳۵۴ واحد آموزش سلامت همگانی جهت

دریافت مشاوره تلفنی همه روزه به جز روزهای

تعطیل



بارداری بدنبال سقط:

بعد از اتمام روند بستری وسقط جنین مادر میبایست تحت نظر متخصص زنان باشد تا در صورت صلاحدید بررسی های بیشتر جهت مشخص شدن علت سقط انجام شود و با مشورت ایشان زمان مناسب برای بارداری مجدد تعیین شود به نحوی که از سقط بعدی پیشگیری شود. تا زمان اجازه پزشک برای بارداری مجدد بیمار باید روش جلوگیری مطمئن داشته باشد تا از بارداری پرخطر وسقط مجدد حتی الامکان جلوگیری شود.

ارزیابی جنین یا بقایای بارداری بعد از سقط:

جهت بررسی علت سقط ،مادر میتواند جنین یا بقایای بارداری دفع شده را داخل محلول نرمان سالین(موجود در بخش) گذاشته و به آزمایشگاه جهت ارزیابی ژنتیک ارسال کند همچنین ارسال نمونه به پاتولوژی میتواند تعیین کننده این باشد که آنچه دفع شده جنین بوده است یا جفت اما از نظر ژنتیک باید در آزمایشگاه ژنتیک بررسی کامل شود.

دارودرمانی بعد از سقط:

بعد از سقط مادر قرص آهن- آنتی بیوتیک و قرص کنترل کننده خون به حسب صلاحدید پزشک معالج تحویل میگردد.